

Cultura de secreções

Preparo:

- Conforme amostra (secreção vaginal, uretral, orofaringe, conjuntival, lesões de pele, etc.);
 - Secreção vaginal ou cervical;
 - Pausa sexual de 48 horas antes do exame;
- Não fazer uso de creme/óvulo vaginal, ducha interna nas 48 horas antes do exame;
 - Não estar no período menstrual;
 - Secreção uretral;
 - Estar a pelo menos 2 horas de retenção urinária;
- Não fazer uso de medicamentos tópicos (creme, pomadas).
Secreção de lesão de pele
- Não fazer uso de medicamentos tópicos (creme, pomadas).
Secreção de orofaringe
- Jejum desejável de 4 horas (somente para evitar vômitos);
 - Não fazer uso de medicação tópica (spray);
- Antissepsia bucal (gargarejo com água), no momento da coleta.
Secreção conjuntival
- Não fazer uso de medicação tópica (pomada, creme oftálmico) e colírio na véspera do exame.
Informar medicação, em especial antimicrobianos e antifúngicos.

Amostra: Secreção, conforme a solicitação médica (indicar sítio ou região)

Método: Cultura em meios enriquecidos e seletivos

Referência: Ausência de crescimento ou cultura negativa

Interpretação: Isolamento e identificação do agente bacteriano causador de infecção. Em casos de culturas positivas é realizado o antibiograma, juntamente ao E-test e ao teste de produção de beta-lactamase, definem a quais antimicrobianos a bactéria causadora da infecção é sensível ou resistente, inferindo diretamente na escolha terapêutica.